

Hıyarda budama: Bitki 30 cm olunca yaprak aralarından çıkan sürgün, çiçek, meyve bir defaya mahsus koparılır. Ana yapraklar asla koparılmamalıdır. Daha sonra çıkan sürgünler tele kadar 1 meyve ve 1 yaprak bırakılarak budanır. Telden sonra 2 meyve ve 2 yaprak bırakılarak budanır.

Domateste budama ise: Koltuk alma, yaprak budaması ve uç alma şeklinde yapılır. Bitkinin gövdesi ile yaprak aralarından çıkan sürgünler kopararak domates bitkisi tek gövde olarak büyütülür. Çift gövdeli domates fideleri ise çift gövde olacak şekilde budanır. Yaprak budaması alttaki salkımdan başlayarak meyve rengi yeşilden beyaza dönmeye başladığında o salkımın altındaki yapraklar koparılır. Uç alma ise 7-8 domates salkımı bırakılarak en üstteki büyüme ucu kopararak yapılır. En üstteki domates salkımının üzerinde 2 yaprak bırakılmasına dikkat edilmelidir. Bitkiler serada bitki sırası üzerine çekilen tellere bağlanan iplere sardırılır.

Hasat: Hıyarda çeşit özelliğine bağlı olmak üzere 18-20 cm olduğunda, domateste de pazar durumuna göre meyve tam yeme olgunluğunda yada pembe renkte hasat edilebilir. Hasat yapılırken mutlaka makas kullanılmalı ve meyveler zedelenmemelidir. Ayrıca her hasadın arkasından bitkilere bol miktarda su verilmelidir.

HAVALANDIRMAYA DİKKAT!

Havalandırma, sera içerisindeki fazla nem ile birlikte bitkiler için olumsuz olan diğer etmenlerin sera dışına atılmasını sağlar. Sera taban alanın % 15-20'si kadar çatı havalandırması ve buna ek olarak yeterli miktarda yan havalandırma pencereleri de olmalıdır. Yetersiz havalandırma hastalık ve zararlı etmenlerin çoğalmasına neden olacağından serada havalandırmaya özen gösterilmelidir.



Detaylı Bilgi İçin İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize Başvurunuz.

Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Akyazı Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad.
52200 - ORDU

Tel: 0 (452) 233 95 30 (3 Hat)
Fax: 0 (452) 233 95 39
www.ordutarim.gov.tr



T.C.
ORDU VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ



ÖRTÜALTI DOMATES VE HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİ



ORDU - 2012

ÖRTÜALTI DOMATES VE HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Çevre ve iklim faktörlerine bağlı kalınmadan her mevsim bitki yetiştirilen alçak ve yüksek tünellere örtü altı denilmektedir. Başarılı bir yetiştiricilik için en önemli faktörlerin başında sera yerinin planlanması gelmektedir. Yer seçiminde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

- ✓ Toprak, seracılık için uygun olmalıdır.
- ✓ Ulaşım kolay olmalıdır.
- ✓ Arazi dere ve nehir kenarlarından uzak olmalıdır.
- ✓ Güneşten en iyi yararlanabileceği ve güney yönü açık olan arazide olmalıdır.
- ✓ Kuzey yamaçlar daha az ışık aldıklarından ve rüzgara açık olduklarından sera kurmaya elverişli değildir.



SERADA TOPRAK HAZIRLIĞI

Hasat sonrası kalan bitki artıkları temizlenerek seradan uzaklaştırılır. Toprak 20-25 cm. derinlikte işlenerek 120 cm parsel 50 cm yol olacak şekilde parseller oluşturulur.

DOĞRU GÜBRELEME İÇİN TOPRAK ANALİZİ MUTLAKA YAPILMALIDIR.



YANLIŞ BUDAMA, GELİRİ MAKAS İLE KESMEK DEMEKTİR.

Taban gübrelemesi; toprak analizi sonuçlarına göre fide dikiminden 10-15 gün önce yapılır, önerilen gübreler toprağın yüzüne serilir ve toprak 15-20 cm. derinlikte işlenir. Ayrıca her 200 m²'lik bir sera için 1,5-2 ton iyi yanmış hayvan gübresi toprağın üst kısmına yarım çapa ağızıyla karıştırılır.

FİDE DİKİMİ

Dikim aşamasına gelmiş fideler 60x60cm. aralıklarla her parsele iki sıra halinde dikilir. Dikimden sonra her bitkiye 2,5-3 lt can suyu verilir. Fidler dikimden bir gün önce sulanmalı, toprağı ile birlikte dikilmeli ve ilk çıkan kotiledon yapraklar asla gömülmemelidir. Aşılı fide dikilecekse aşı yerlerinin gömülmesine dikkat edilmeli, çift gövdeli domates fidesi dikimi ise her parsele tek sıra halinde yapılmalıdır.

BAKIM İŞLERİ

Dikimle birlikte verilen can suyundan sonra hıyarda ilk hasada, domateste meyveler ceviz büyüklüğüne gelinceye kadar mümkün olduğu kadar sulama yapılmaz. Ancak toprakta nem oranı azalmışsa az miktarda sulama yapılabilir.

Dikimden bir hafta sonra oluşan kaymak tabakası kırılmalı, boğaz doldurma işlemi yapılmalıdır. Seradaki bitkilerin yarıdan fazlasında çiçeklenme görüldüğünde 10 gün ara ile dönüşümlü olarak azotlu ve potasyumlu gübrelerle üst gübreleme yapılmalıdır.