

Fındık kurduna karşı etkili ve ekonomik bir mücadele için; Uygun zamanda, uygun dozda, uygun havada,

BİR BÖLGEDE BİR HAFTA İÇİNDE BİR DEFADA

ilaçlama bitirilmelidir.

KULLANILAN İLAÇLAR

Etkili Maddesi	Dönüme Dozu
Spinosad 480 g/l SC	15 ml
Methiocarb % 50 WP	100 gr
L. Cyhalothrin + Thiamethoxam 106 + 141 gr/l SC	10 ml
Deltamethrin 20 g/l + Thiacloprid 150 gr/l OP	25 ml



Fındık kurdundan zarar görmüş meyveler

**BİR BÖLGEDE,
BİR HAFTA İÇİNDE VE
BİR DEFADA
İLAÇLAMAYI BİTİRİNİZ...**



Detaylı Bilgi İçin İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize Başvurunuz.

**Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Akyazı Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad.
52200 - ORDU**

**Tel: 0 (452) 233 95 30 (3 Hat)
Fax: 0 (452) 233 95 39
www.ordutarim.gov.tr**



**T.C.
ORDU VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**



FINDIK KURDU VE MÜCADELESİ



ORDU - 2012

FINDIK KURDU

Fındığın ana zararlısı olan fındık kurdu, 6-7 mm boyunda kül renkli bir böcektir. Bu zararlıya karşı etkin bir mücadele yapılmadığı takdirde, önemli derecede ürün kaybına neden olmaktadır. Bir çift fındık kurdu ergini (dişi ve erkek); Beslenmek ve yumurta koymak suretiyle 200 adet fındık meyvesine zarar verir.

Fındık kurdu mücadelesinde amaç; Meyveleri bu zararlıdan korumaktır. Bunun için ergin böcekler ekonomik zarar yapmaya başladıkları dönemde bahçeyi ilaçlı bulundurmak gerekir.



Mercimek iriliğine ulaşmış meyveler

Mücadele zamanı; İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince ilan edilmekte olup, yine de bu ilan duyulmadığı takdirde; ***Bahçede hakim çeşitlerin yarıdan fazlasında; Meyve mercimek büyüklüğüne gelince mücadeleye başlanmalıdır.***



Fındık kurdunun pupa dönemi

İlaçlamaya başlamadan önce bahçede fındık kurdu sayımı yapılmalıdır. Bunun için akşam veya sabahın alacakaranlığında beyaz bir çarşaf alınıp iki kişi ile birlikte bahçeye gidilir. Bahçede geliş güzel en az 10 ocak seçilir. Seçilen ocak dalları çarşafın üzerine sertçe silkenir. Ortalama olarak 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu ergini tespit edilirse ilaçlama yapılır. Aksi takdirde ilaçlama yapılmamalıdır.

Sulu ilaçlar, sırt körüğü (pülverizatör) ile atılacaksa; Bir körük dolusu suya dönüme tavsiye edilen dozun yarısı kadar ilaç konulup, normal büyüklükte 25 ocaklık yer; şayet sırt motoru (atomizör) ile ilaçlama yapılacaksa bir depo dolusu suya dönüme tavsiye edilen ilacın tamamı konulup, 50 ocaklık yer (1 dönüm) ilaçlanmalıdır.



Fındık kurdu larvası

İlaçlama esnasında herhangi bir şey yenilip, içilmemelidir. Kötü hava şartlarında (yağmur, rüzgar v.s.) ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 8 saat içinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. İlaçlama yapılan bahçede en az 10 gün süreyle hayvan otlatılmamalıdır.